## 逍遥散加减治疗经期头痛 96 例

# Treating 96 cases of menstrual headache with Xiaoyao san

杜春霞

(甘肃省成县中医院,甘肃 成县,742500)

## 中图分类号: R271.11<sup>+</sup>6 文献标识码: A 文章编号: 1674-7860(2011)17-0049-01

【摘 要】 经期头痛是发作性神经血管障碍的一种综合症,常因情志内伤、肝气郁结,肝风内动,或外有风邪而诱发,笔者经以逍遥散治疗 96 例,治愈 42 例,显效 35 例,有效 11 例,无效 8 例。

【关键词】 经期头痛; 逍遥散加减治疗; 疗效

【Abstract】 Menstrual headache is a syndrome of paroxysmal neurovascular disorder, often was caused by Qingzhi Neishang, Ganqi Yujie, Ganfeng Neidong, or Waiyou Fengxie, I treated 96 cases with Xiaoyao san, 42 cases were cured, 35 cases were markedly effective, 11 cases were effective, invalid for 8 cases.

**Keywords** Menstrual headache; Treating with Xiaoyao san; Effect

经期头痛是临床常见的一种发作性神经-血管功能障碍,每逢行经前或经期以反复发生为特征,其疼痛较剧,常严重影响人们的生活和工作,近年来由于生活水平的提高及工作压力有增多趋势,临床中用逍遥散加减治疗头痛取得较好的疗效。现介绍如下。

### 1 临床资料

观察 144 例,均为 2005 年 2 月~2010 年 5 月门诊病例,根据其临床及发作特点头痛的分类和标准,无严重心脑血管疾病及其它器官疾病合并者。中医辨证主要以气血为病,素体血虚,经行时益感不足,血不上荣或因瘀血内阻,脉络不通或情志内伤,气郁化火,皆可导致本病。随机分为两组,治疗组 96 例,年龄最大的 52 岁,最小的 15 岁,平均年龄(31.52±3.0)岁,病程 1~10 年。对照组 48 例,年龄 18~52 岁,平均年龄(32.02±2.29)岁,病程 1~10 年,对照组年龄、病程与治疗组相比无显著性差异,具有可比性。

#### 2 治疗方法

对照组: 在发作期用谷维素 20mg, 1 日 3 次, 索米痛 0.5g, 1 日 2 次, 或元胡止痛片 4 片, 1 日 3 次, 口服。在前驱期或先兆时服用,直到头痛停止。

治疗组:以逍遥散为主治疗,药用柴胡 15g,白芍 10g,白术 10g,炙草 6g,当归 15g,茯苓 10g,煨姜 6g,薄荷 10g,水煎服,每日一剂,头煎加水 500ml,取汁 180ml,二煎加水 400ml,取汁 120ml,二煎相合,分 3 次口服,一日一剂,14 天为一疗程,按以不同症型加减化裁。对于经期血虚性头痛,症见心悸少寐,神疲乏力,舌淡苔薄,脉虚细者,以养血益气,方中去薄荷、煨姜、加川芎、人参、熟地、女贞子。若肝阳偏亢性头痛,症见头晕目眩,烦躁易怒,口苦咽干,舌质红,苔薄黄,脉弦细数者,以养阴清热,柔肝息风,方中去当归、煨姜、薄荷,加羚羊角、石决明、菊花、丹皮。血瘀性头痛,症

见瘀血内停,脉络不通,阻塞清窍,血阻于胞,经血紫黯有块,伴有小腹疼痛,舌黯或尖边有瘀点,脉细涩或弦涩者,以可调气活血,化瘀通胳,方中去薄荷、加川芎、桃仁、红花、当归、延胡索、大枣,服法同上。疗程结束后,评价疗效。

#### 3 治疗结果

疗效判定标准:治愈、临床症状消失,随访一年无复发者; 显效,临床症状消失,显效但一年内复发者;有效,临床症状 明显减轻,发作时间间隔时间延长,或发作时间缩短者;无效, 临床症状有所好转,但不明显者。

结果:治疗组 96 例,治愈 42 例,占 43.75%,显效 35 例,占 36.45%,有效 11 例,占 11.46%,无效 8 例,占 8.3%。对照组 48 例,治愈 7 例,占 14.5%,显效 15 例,占 10.25%,有效 16 例,占 33.33%,无效 10 例,占 20.83%。治疗组疗效差异明显,有显著的意义。治疗组疗效明显优于对照组,远期效果尤为明显。

#### 4 体 会

妇女经期头痛属中医"头痛"范畴,《张氏医通》有经行辄头痛的记载。中医学认为,头为诸阳之会,清阳之腑,又为髓海之所在,五腑精华之血,六腑清阳之气,皆上注于头。气血逆乱,瘀阻脉络,脑失所养,皆可致。故常因素体虚弱,慢性失血,或脾虚化源不足,情志内伤,忿怒郁结,气郁化火,经行时经气偏旺,肝失条达,气机不宣,血行不畅,瘀血内阻,脉络不通而诱发,故用逍遥散基本方加减治疗,方中柴胡、川芎疏肝解郁,辛温走窜,上行头目,白芍、当归养血柔肝,白术、茯苓健脾和中,宁心安神,煨姜温中和胃,薄荷协同条达肝气;诸药调配,达到疏肝解郁、养血健脾、调气和血、通络止痛的目的。同时本方临床运用,克服了止痛剂,口服镇痛、镇静药的副作用,达到临床满意效果。

编号: EA-11060210 (修回: 2011-09-07)